

#001

Objectifs du carnet

- Maîtriser le raisonnement devant diarrhée aiguë et déshydratation en contexte EDN et en garde.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Diarrhée aiguë

- Évaluer déshydratation, fièvre, sang, douleur, voyage, antibiotique récent et terrain fragile.
- La majorité est infectieuse virale et relève de réhydratation.
- Selles sanglantes, sepsis, immunodépression ou retour de voyage modifient le bilan.
- Antibiothérapie seulement si indication clinique ou microbiologique.

#003

Réhydratation

- SRO chez enfant et sujet fragile; voie IV si choc, vomissements incoercibles ou déshydratation sévère.
- Surveiller poids, diurèse, conscience, natrémie et fonction rénale selon gravité.
- Éviter ralentisseurs si dysenterie, fièvre élevée ou suspicion de colite sévère.
- Prévenir transmission: hygiène des mains, éviction collectivité selon contexte.

#004

Pièges EDN

- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, toujours séparer symptôme, gravité, diagnostic étiologique et retentissement nutritionnel.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, ne pas attribuer sang, amaigrissement ou anémie à une cause bénigne sans exploration adaptée.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, penser médicaments: AINS, anticoagulants, antibiotiques, opiacés, immunosuppresseurs.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, réévaluer tôt si douleur, fièvre, vomissements ou trouble biologique progresse.

#005

Mini-cas à résoudre

- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, dire quel diagnostic dangereux doit être exclu dans l'heure.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, choisir l'examen qui répond à la question clinique principale.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, définir ce qui impose hospitalisation, chirurgie, endoscopie ou avis spécialisé.
- Pour Diarrhée Aiguë et Déshydratation, prévoir traitement initial, surveillance et consignes de retour.

Sources: Document Source National CDU-HGE / SNFGE R2C; Cours officiels R2C HGE du collège des enseignants; Supports locaux SSD1/Alex/15- Hépatogastro-entérologie 2