

#001

Objectifs du carnet

Tuméfaction Pelvienne chez la Femme

Carte de révision gynéco-obstétrique

- 1 Masse pelvienne peut être ovarienne, utérine, tubaire, digestive ou urinaire.
- 2 Évaluer douleur aiguë, fièvre, grossesse, torsion, rupture ou hémorragie.
- 3 Échographie pelvienne caractérise taille, contenu, vascularisation et origine.
- 4 Tumeur ovarienne suspecte selon aspect solide, végétations, ascite, bilatéralité.

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Maîtriser le raisonnement devant tuméfaction pelvienne chez la femme en contexte EDN et en garde.
- Pour Tuméfaction Pelvienne chez la Femme, identifier les signes de gravité avant de détailler l'étiologie.
- Pour Tuméfaction Pelvienne chez la Femme, choisir les examens utiles sans multiplier les explorations non contributives.
- Pour Tuméfaction Pelvienne chez la Femme, connaître les traitements initiaux, la surveillance et les critères d'avis spécialisé.

#002

Reconnaître et orienter

- Masse pelvienne peut être ovarienne, utérine, tubaire, digestive ou urinaire.
- Évaluer douleur aiguë, fièvre, grossesse, torsion, rupture ou hémorragie.
- Échographie pelvienne caractérise taille, contenu, vascularisation et origine.
- Tumeur ovarienne suspecte selon aspect solide, végétations, ascite, bilatéralité.

#003

Prise en charge et surveillance

- Fibrome: saignements, compression, infertilité ou découverte fortuite.
- Kyste fonctionnel peut être surveillé si critères rassurants.
- Marqueurs tumoraux se prescrivent selon âge et imagerie, pas en dépistage isolé.
- Avis spécialisé si masse complexe, douleur aiguë ou suspicion maligne.

#004

Pièges fréquents

- Pour Tuméfaction Pelvienne chez la Femme, toujours éliminer une grossesse devant douleur, saignement ou aménorrhée en âge de procréer.
- Une tuméfaction pelvienne douloureuse, fébrile, hémorragique ou associée à grossesse impose d'exclure torsion, abcès ou GEU.
- Pour Tuméfaction Pelvienne chez la Femme, ne pas banaliser douleur pelvienne, saignement post-ménopausique, fièvre ou vulnérabilité.
- Pour Tuméfaction Pelvienne chez la Femme, adapter chaque décision au terme, au projet de grossesse, au consentement et au terrain.

#005

Synthèse opérationnelle

- Pour Tumeur Pelvienne chez la Femme, dater, localiser, mesurer la gravité et choisir l'examen qui change la conduite.
- Pour Tumeur Pelvienne chez la Femme, associer prévention, information loyale, contraception ou projet parental selon le contexte.
- Pour Tumeur Pelvienne chez la Femme, coordonner gynécologie, obstétrique, anesthésie, pédiatrie, oncologie ou psychiatrie si besoin.
- Pour Tumeur Pelvienne chez la Femme, prévoir suivi, signes d'alerte et accès rapide aux soins.

Sources: Référentiel du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français; Recommandations HAS, CNGOF et INCa selon les thèmes; Supports locaux SSD1/Alex/29-Gynécologie obstétricale; Banque d'images recadrées SSD1/Carnets/phase1_collecte