

#001

Objectifs du carnet

Amiante, Silice et Pneumoconioses

Carte de revision - Medecine du Travail

- 1 Reconnaître amiante, silice et pneumoconioses : exposition ancienne, plaques, fibrose, cancer et suivi post-professionnel.
- 2 Rechercher les determinants majeurs : age, terrain, antecedents, traitements, grossesse, immunodepression, contexte familial et social.
- 3 Commencer par la gravite immediate avant le bilan etiological complet.
- 4 Formuler une conduite pratique avec objectif, traitement, surveillance et seuil d'avis specialise.

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Situer amiante, Silice et Pneumoconioses dans le champ de médecine du travail et préciser ce qui doit être acquis avant d’aller plus loin.
- Décrire la présentation attendue: exposition ancienne, plaques, fibrose, cancer et suivi post-professionnel.
- Identifier pour amiante, Silice et Pneumoconioses les situations qui changent immédiatement le niveau de soins: danger immédiat au poste, exposition CMR, risque collectif, inaptitude non anticipée ou souffrance psychique professionnelle.
- Pour Amiante, Silice et Pneumoconioses, formuler une décision finale datée: lieu de prise en charge, traitement, surveillance et délai de réévaluation.

#002

Identifier et hierarchiser

- Interroger et examiner en ciblant amiante, Silice et Pneumoconioses: symptômes cardinaux, chronologie, facteurs déclenchants et retentissement.
- Préciser le terrain utile pour amiante, Silice et Pneumoconioses: âge, terrain, traitements, contexte familial et vulnérabilités.
- Pour Amiante, Silice et Pneumoconioses, séparer forme simple, forme compliquée, diagnostic différentiel dangereux et situation relevant d'un recours senior.
- Pour Amiante, Silice et Pneumoconioses, choisir les examens qui répondent à une question explicite: confirmer, stadifier, surveiller ou préparer un geste.

#003

Traiter et surveiller

- Première décision pour amiante, Silice et Pneumoconioses: confirmer le diagnostic utile, traiter la gravité, organiser l'avis spécialisé et expliquer le plan.
- Suivi rapproché de amiante, Silice et Pneumoconioses: symptômes, constantes, biologie ou imagerie pertinente, tolérance du traitement, autonomie et délai de contrôle.
- Escalader vers médecin du travail, employeur pour aménagements et médecin traitant avec accord si gravité, doute persistant, échec thérapeutique ou besoin de geste spécialisé.
- Pour Amiante, Silice et Pneumoconioses, adapter la stratégie au patient réel: âge, comorbidités, traitements, souhaits, autonomie et ressources disponibles.

#004

Pieges frequents

- Piège classique dans amiante, Silice et Pneumoconioses: rassurer trop tôt devant une présentation incomplète ou un examen initial normal.
- Piège thérapeutique: traiter un symptôme de amiante, Silice et Pneumoconioses sans planifier la réponse attendue et le seuil d'échec.
- Pour Amiante, Silice et Pneumoconioses, piège d'organisation: oublier d'écrire qui revoit le patient, quand, avec quel résultat attendu.
- Pour Amiante, Silice et Pneumoconioses, piège EDN: mélanger diagnostic, gravité et orientation; ces trois décisions doivent rester séparées.

#005

Synthese operationnelle

- Synthèse de amiante, Silice et Pneumoconioses: nommer le problème, le mécanisme probable, la gravité et l'objectif de prise en charge.
- Documenter ce qui manque encore pour amiante, Silice et Pneumoconioses: examen, biologie, imagerie, avis ou résultat microbiologique/anatomopathologique.
- Pour Amiante, Silice et Pneumoconioses, prévoir les complications prévisibles et les signes d'alerte que le patient ou l'équipe doivent surveiller.
- Pour Amiante, Silice et Pneumoconioses, terminer par une transmission courte: diagnostic retenu, hypothèse dangereuse exclue ou non, traitement, surveillance.

Sources: Supports locaux SSD1/Alex/26- Medecine du travail; Referentiels EDN et collegiaux de Medecine du Travail; Synthese pedagogique Codex beta.docentra, francais seul, 4 puces maximum par slide