

#001

Objectifs du carnet

Nutrition Enterales et Parenterales

Carte de révision - Nutrition

- 1 Reconnaître nutrition entérale et parentérale : indication, voie, complications, surveillance et sevrage.
- 2 Rechercher les déterminants majeurs : âge, terrain, antécédents, traitements, grossesse, immunodépression, contexte familial et social.
- 3 Commencer par la gravité immédiate avant le bilan étiologique complet.
- 4 Formuler une conduite pratique avec objectif, traitement, surveillance et seuil d'avis spécialisé.

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Situer nutrition Entérale et Parentérale dans le champ de nutrition et préciser ce qui doit être acquis avant d'aller plus loin.
- Décrire la présentation attendue: indication, voie, complications, surveillance et sevrage.
- Identifier pour nutrition Entérale et Parentérale les situations qui changent immédiatement le niveau de soins: dénutrition sévère, trouble hydro-électrolytique, renutrition inadaptée, obésité compliquée ou trouble du comportement alimentaire.
- Pour Nutrition Entérale et Parentérale, formuler une décision finale datée: lieu de prise en charge, traitement, surveillance et délai de réévaluation.

#002

Identifier et hierarchiser

- Interroger et examiner en ciblant nutrition Entérale et Parentérale: symptômes cardinaux, chronologie, facteurs déclenchants et retentissement.
- Préciser le terrain utile pour nutrition Entérale et Parentérale: âge, terrain, traitements, contexte familial et vulnérabilités.
- Pour Nutrition Entérale et Parentérale, séparer forme simple, forme compliquée, diagnostic différentiel dangereux et situation relevant d'un recours senior.
- Pour Nutrition Entérale et Parentérale, choisir les examens qui répondent à une question explicite: confirmer, stadifier, surveiller ou préparer un geste.

#003

Traiter et surveiller

- Première décision pour nutrition Entérale et Parentérale: confirmer le diagnostic utile, traiter la gravité, organiser l'avis spécialisé et expliquer le plan.
- Suivi rapproché de nutrition Entérale et Parentérale: symptômes, constantes, biologie ou imagerie pertinente, tolérance du traitement, autonomie et délai de contrôle.
- Escalader vers diététicien, nutritionniste, endocrinologue ou équipe support si gravité, doute persistant, échec thérapeutique ou besoin de geste spécialisé.
- Pour Nutrition Entérale et Parentérale, adapter la stratégie au patient réel: âge, comorbidités, traitements, souhaits, autonomie et ressources disponibles.

#004

Pièges fréquents

- Piège classique dans nutrition Entérale et Parentérale: rassurer trop tôt devant une présentation incomplète ou un examen initial normal.
- Piège thérapeutique: traiter un symptôme de nutrition Entérale et Parentérale sans planifier la réponse attendue et le seuil d'échec.
- Pour Nutrition Entérale et Parentérale, piège d'organisation: oublier d'écrire qui revoit le patient, quand, avec quel résultat attendu.
- Pour Nutrition Entérale et Parentérale, piège EDN: mélanger diagnostic, gravité et orientation; ces trois décisions doivent rester séparées.

#005

Synthèse opérationnelle

- Synthèse de nutrition Entérale et Parentérale: nommer le problème, le mécanisme probable, la gravité et l'objectif de prise en charge.
- Documenter ce qui manque encore pour nutrition Entérale et Parentérale: examen, biologie, imagerie, avis ou résultat microbiologique/anatomopathologique.
- Pour Nutrition Entérale et Parentérale, prévoir les complications prévisibles et les signes d'alerte que le patient ou l'équipe doivent surveiller.
- Pour Nutrition Entérale et Parentérale, terminer par une transmission courte: diagnostic retenu, hypothèse dangereuse exclue ou non, traitement, surveillance.

Sources: Supports locaux SSD1/Alex/28- Nutrition; Referentiels EDN et collegiaux de Nutrition; Synthèse pédagogique Codex beta.docentra, français seul, 4 puces maximum par slide