

#001

Objectifs du carnet

Risque Suicidaire et Crise

Carte de revision - Psychiatrie

- 1 Reconnaître risque suicidaire et crise : ideation, scenario, moyens, facteurs protecteurs et urgence vitale.
- 2 Rechercher les determinants majeurs : age, terrain, antecedents, traitements, grossesse, immunodepression, contexte familial et social.
- 3 Commencer par la gravite immediate avant le bilan etilogique complet.
- 4 Formuler une conduite pratique avec objectif, traitement, surveillance et seuil d'avis specialise.

Visuel extrait et recadré depuis les cours vidéo du SSD1.

Captures de cours recadrées depuis SSD1, usage pédagogique.

- Situer risque Suicidaire et Crise dans le champ de psychiatrie et préciser ce qui doit être acquis avant d’aller plus loin.
- Décrire la présentation attendue: ideation, scenario, moyens, facteurs protecteurs et urgence vitale.
- Identifier pour risque Suicidaire et Crise les situations qui changent immédiatement le niveau de soins: risque suicidaire, hétéro-agressivité, agitation, confusion organique, intoxication, rupture de soins ou vulnérabilité sociale.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, formuler une décision finale datée: lieu de prise en charge, traitement, surveillance et délai de réévaluation.

#002

Identifier et hiérarchiser

- Interroger et examiner en ciblant risque Suicidaire et Crise: symptômes cardinaux, chronologie, facteurs déclenchants et retentissement.
- Préciser le terrain utile pour risque Suicidaire et Crise: âge, terrain, traitements, contexte familial et vulnérabilités.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, séparer forme simple, forme compliquée, diagnostic différentiel dangereux et situation relevant d'un recours senior.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, choisir les examens qui répondent à une question explicite: confirmer, stadifier, surveiller ou préparer un geste.

#003

Traiter et surveiller

- Première décision pour risque Suicidaire et Crise: confirmer le diagnostic utile, traiter la gravité, organiser l'avis spécialisé et expliquer le plan.
- Suivi rapproché de risque Suicidaire et Crise: symptômes, constantes, biologie ou imagerie pertinente, tolérance du traitement, autonomie et délai de contrôle.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, escalader vers psychiatre senior et filière de crise si gravité, doute persistant, échec thérapeutique ou besoin de geste spécialisé.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, adapter la stratégie au patient réel: âge, comorbidités, traitements, souhaits, autonomie et ressources disponibles.

#004

Pièges fréquents

- Piège classique dans risque Suicidaire et Crise: rassurer trop tôt devant une présentation incomplète ou un examen initial normal.
- Piège thérapeutique: traiter un symptôme de risque Suicidaire et Crise sans planifier la réponse attendue et le seuil d'échec.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, piège d'organisation: oublier d'écrire qui revoit le patient, quand, avec quel résultat attendu.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, piège EDN: mélanger diagnostic, gravité et orientation; ces trois décisions doivent rester séparées.

#005

Synthèse opérationnelle

- Synthèse de risque Suicidaire et Crise: nommer le problème, le mécanisme probable, la gravité et l'objectif de prise en charge.
- Documenter ce qui manque encore pour risque Suicidaire et Crise: examen, biologie, imagerie, avis ou résultat microbiologique/anatomopathologique.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, prévoir les complications prévisibles et les signes d'alerte que le patient ou l'équipe doivent surveiller.
- Pour Risque Suicidaire et Crise, terminer par une transmission courte: diagnostic retenu, hypothèse dangereuse exclue ou non, traitement, surveillance.

Sources: Supports locaux SSD1/Alex/17- Psychiatrie; Referentiels EDN et collegiaux de Psychiatrie; Synthèse pédagogique Codex beta.docentra, français seul, 4 puces maximum par slide